

LINNÉ
QR91
.C113
1788
t.1
pt.6

CAROLI A LINNÉ
SYSTEMA
NATURAE.

TOM. I. PARS VI.

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN

- Schroet. Flusconch. t. II. min. D. f. 3.*
Habitat frequens in Thuringiae aquis prope Thangelstedt.
- fixa. 17. S. testa ex lapillis majoribus minoribusque conflata apicem
 versus attenuata.
Schroet. Flusconch. t. II. min. C. f. 12.
Habitat prope Vinariam et Thangelstedt Thuringiae, saxis
subaquaticis affixa, gregaria, latere, quo affigitur, aper-
to, testa ad pollicem usque longa.
- clavata. 18. S. testa e lapillis conflata: sine aperto clavato e lapillis
 majoribus compacto.
Schroet. Flusconch. t. II. min. D. f. 2.
Habitat solitaria in Thuringia, prope Vinariam.
- corticalis. 19. S. testa ex corticum fragmentis, ad finem ex caulibus
 conflata.
Schroet. Flusconch. t. II. min. D. f. 5.
Habitat frequens in rivulo Thuringiae prope Thangelstedt,
varietate innumera.
- arundina- 20. S. testa subconica utrinque aperta ex fragmentis corticis
 cea. arundinis sibi impositis structa.
Schroet. Flusconch. t. II. min. D. f. 6.
Habitat prope Vinariam, testa vix ultra pollicem longa.
- aculeata. 21. S. testa teretiusecula ex culmis cauliculisque prominulis
 conflata.
Schroet. Flusconch. t. II. min. D. f. 7.
Habitat frequens prope Thangelstedt in Thuringia, testa vix
ultra pollicem longa, nunc magis conica, nunc magis cy-
lindrica.
- marfupia- 22. S. testa nigra; sine aperto cylindrico angustiori, altera
 lis. parte turgida ovata.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 591. t. 6. f. 21.
Habitat in mari - - - testa ultra 2 pollices longa, ex
arena nigra composita, intus laevi.
- norwegi- 23. S. testa teretiusecula utrinque aperta fragili membranacea
 ca. exterius granulis arenae minutissimis consista.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 591. n. 20.
Habitat in Norwegia, testa ultra 4 pollices longa, pennae
cervinae crassitie.